

INTISARI

CHLORELLA, C. 2014. POLA PENGGUNAAN OBAT ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI INSTALASI RAWAT JALAN RSJD SURAKARTA PADA TAHUN 2013, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA.

Skizoprenia merupakan gangguan pikiran kombinasi dari halusinasi, delusi dan berfikir teratur dan perilaku. Kemampuan orang dengan skizoprenia untuk berfungsi normal dan merawat diri mereka sendiri cenderung menurun dari waktu ke waktu. Penyakit ini merupakan kondisi kronis yang memerlukan pengobatan seumur hidup, sehingga diperlukan pemantauan penggunaan antipsikotik sebagai terapi farmakologi utama untuk skizoprenia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan antipsikotik pada pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta pada tahun 2013.

Pasien yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pasien skizofrenia PKMS Silver di Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta tahun 2013, pengambilan data dilakukan secara retrospektif melalui rekam medik meliputi diagnosa pasien, data penggunaan obat, jenis kelamin dan umur dengan menggunakan metode Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis antipsikotik yang digunakan meliputi Risperidon, Klozapin, Trifluperazin, Klorpromazin, dan Haloperidol. Jumlah penggunaan obat antipsikotik oleh pasien skizofrenia PKMS Silver selama tahun 2013 di Instalasi Rawat Jalan RSJD terbesar tunggal adalah Risperidon sebanyak 29 kasus (10,2%) dan terbesar kombinasi adalah Risperidon-Klorpromazin sebanyak 88 kasus (31,1%). Obat-obat antipsikotik yang digunakan untuk pasien Skizofrenia belum sepenuhnya sesuai dengan Formulariu Rumah Sakit, tetapi sesuai dengan *Guidline Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual*.

Kata kunci : Obat Antipsikotik, Pasien Rawat Jalan, Metode Deskriptif

ABSTRACT

CHLORELLA, C., 2014, PATTERN USE OF ANTIPSYCHOTIC DRUGS IN SCHIZOPHRENIA PATIENS AT INSTALLATION IN OUTPATIENT SURAKARTA REGIONAL MENTAL HOSPITAL IN 2013, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY, SURAKARTA.

Schizophrenia is a thought disorder combination of hallucinations, delusions and disorganized thinking and behavior. The ability of people with schizophrenia to function normally and take care of themselves tend to decline over time. This disease is a chronic condition that requires lifelong treatment, so that the necessary monitoring of the use of antipsychotics as the primary pharmacological treatment for schizophrenia. This study aims to determine the pattern of use of antipsychotics in schizophrenic patients in the Outpatient Installation Regional Mental Hospital (RSJD) Surakarta in 2013.

Patients included in this study were patients with schizophrenia PKMS Silver in Outpatient Installation RSJD Surakarta in 2013, retrospective data collection through the patient's medical records include diagnoses, data on the use of drugs, sex and age by using descriptive methods.

The results showed that the type of antipsychotics used include risperidone, clozapine, Trifluperazin, Chlorpromazine, and Haloperidol. The number of antipsychotic drug use by patients with schizophrenia PKMS Silver during the year 2013 in the Outpatient Installation is the single largest RSJD risperidone were 29 cases (10.2%) and the largest is the combination of Risperidone - Chlorpromazine total of 88 cases (31.1%). Antipsychotic drugs are used for patients with schizophrenia is not fully in accordance with Hospital Formularium, but according to the Texas Medication Algorithm Project guideline Procedural Manual.

Keyword: Antipsychotic drugs, Outpatient, Descriptive Methods.