

INTISARI

SAPUTRI, L.C. 2014. POLA PENGGUNAAN OBAT ANTIDEPRESAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI INSTALASI RAWAT JALAN RSJD SURAKARTA TAHUN 2013, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA.

Skizofrenia adalah gangguan psikiatrik yang sangat kompleks. Penyakit ini menggambarkan sindrom heterogenus dengan perilaku yang aneh dan tidak terorganisir, delusi, halusinasi, dan penurunan fungsi psikososial. Umumnya pengobatan skizofrenia dilakukan dengan terapi biologis memakai obat antipsikotik dan bersifat jangka panjang. Antipsikotik juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan berbagai kelas obat lainnya, seperti stabilisator mood, antidepressan dan antiansietas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan dan kesesuaian antidepressan pada pasien skizofrenia di RSJD Surakarta tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif melalui rekam medik. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui profil pasien dan profil penggunaan obat antidepressan, kemudian penelitian analitik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan obat antidepressan pada pasien skizofrenia dengan formularium RSJD Surakarta dan *guideline Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual Schizophrenia Treatment Algorithms*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa obat antidepressan yang digunakan pada pengobatan pasien skizofrenia adalah trisiklik 80%, SSRI sebesar 13%, dan tetrasiklik 7%. Kesesuaian penggunaan antidepressan dengan formularium RSJD Surakarta adalah sebesar 23%. Kesesuaian penggunaan antidepressan dengan *Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual Schizophrenia Treatment Algorithms* adalah sebesar 87%.

Kata kunci : Skizofrenia, antidepressan, pola penggunaan obat, kesesuaian obat.

ABSTRACT

SAPUTRI, L.C., 2014. USAGE PATTERN OF ANTIDEPRESSANT DRUGS IN SCHIZOPHRENIC PATIENT AT OUTPATIENT INSTALLATION OF PSYCHIATRIC HOSPITAL SURAKARTA IN 2013, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY. SURAKARTA .

Schizophrenia is a psychiatric disorder which is very complex. This disease illustrate heterogeneous syndrome with bizarre and disorganized behavior, delusion, hallucination, and decrease of psychosocial function. Generally, schizophrenia treatment conducted by biologic therapy using antipsychotic drugs and long-term. Antipsychotic can also be used in combination with various other drug classes, such as mood stabilizer, antidepressant and antianxiety. This study was aimed to determine the usage pattern and antidepressant suitability in schizophrenic patients at Psychiatric Hospital Surakarta in 2013.

This research was conducted by descriptive design and data collection retrospectively through medical record. Data were analyzed descriptively to determine patient profile and usage profile of antidepressant drugs, then analytic research was conducted to determine suitability of antidepressant drugs usage in schizophrenic patients with formulary of Psychiatric Hospital Surakarta and Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual Schizophrenia Treatment Algorithms .

Based on research results, obtained data that antidepressant which used in schizophrenic patients treatment were tricyclic as 80%, SSRI as 13%, and tetrasiklik as 7%. Suitability of antidepressants usage with formulary of Psychiatric Hospital Surakarta was 23%. Suitability of antidepressants usage with Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual Schizophrenia Treatment Algorithms was 87%.

Keywords : Schizophrenia, antidepressant, usage pattern, drug suitability