

## INTISARI

### **HARJA, A.M., EVALUASI PENGGUNAAN ANTIDEPRESAN PADA PENGOBATAN PASIEN DEPRESI MAYOR RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2011, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA.**

Depresi merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh setiap individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat depresi adalah gangguan mental yang umum terjadi diantara populasi. Diperkirakan 350 juta manusia di muka bumi ini menderita depresi mayor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat antidepresan pada pengobatan pasien depresi mayor rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

Jenis penelitian ini adalah non eksperimental dengan rancangan deskriptif dan pengambilan data secara retrospektif. Populasi penelitian adalah pasien depresi mayor dengan ciri symptom psikotik yang menjalani rawat inap di RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 diambil sebanyak 61 pasien. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui profil pasien dan profil penggunaan obat antidepresan, kemudian penelitian analitik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan obat antidepresan berdasarkan faktor tepat dosis, frekuensi dan pilihan obat.

Berdasarkan penelitian deskriptif diperoleh data bahwa antidepresan yang digunakan adalah SSRI sebanyak 47, 5 %, trisiklik 39,3 %, tetrasiklik 13, 1 %. Kesesuaian pola penggunaan obat antidepresan berdasarkan *Practice Guideline For The Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, 3<sup>th</sup> ed. American Psychiatric Assosiation* 2010, diperoleh hasil tepat obat 95, 1 %, tepat dosis 93, 4 %, tepat frekuensi 95, 1 %. Diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan obat antidepresan pada pengobatan pasien depresi mayor rawat inap di RSJD Surakarta tahun 2011 sudah sesuai.

Kata kunci : Depresi mayor, Antidepresan, Ketepatan penggunaan obat, Pola penggunaan obat, RSJD Surakarta.

## ABSTRACT

**HARJA, A.M., EVALUATION OF THE USE OF ANTIDEPRESSANT IN THE TREATMENT OF MAJOR DEPRESSED PATIENTS ADMITTED TO THE MENTAL HOSPITAL SURAKARTA IN 2011, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY, SURAKARTA.**

Depression is one form of mental disorder are motivated by a variety of life problems faced by each individual. The World Health Organization (WHO) noted that depression is a common mental disorder among the population. An estimated 350 million people in the world suffer from major depression. This study aimed to determine the pattern of use of antidepressants in the treatment of major depressed patients hospitalized in the Mental Hospital Surakarta, Central Java Province in 2011.

This research is non-experimental, descriptive design and sampling data retrospectively. The study population was patients with characteristic symptoms of major depressive psychotic hospitalized in RSJD Surakarta, Central Java Province In 2011 a total of 61 patients were taken. Data were analyzed descriptively to determine the patient profile and the profile of use of antidepressants, and analytical research conducted to determine the suitability of the use of antidepressant medications by factors right dose, frequency and choice of drugs.

Based penelitian descriptive data showed that SSRI antidepressants are used by 47, 5%, tricyclic 39.3%, tetrasiklik 13, 1%. Suitability patterns of antidepressant drug use by *Practice Guideline For The Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, 3<sup>th</sup> ed. American Psychiatric Assosiation 2010*, obtained the results right medicine 95, 1%, right dose 93, 4%, on the frequency of 95, 1%. The conclusions are that the use of antidepressants in the treatment of major depressive patients hospitalized in RSJD Surakarta in 2011 was appropriate. Keywords: Major depression, Antidepressants, accuracy of drug use, drug use patterns, RSJD Surakarta.