

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai afinitas dari senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin terhadap DHFR bakteri lebih tinggi dibandingkan DHFR sel mamalia dilihat dari ΔG *binding*.
2. Pola interaksi lima belas senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin terhadap enzim DHFR bakteri menunjukkan ikatan hidrogen dengan asam amino Asp31A dan DHFR sel mamalia menunjukkan ikatan hidrogen dengan asam amino Glu30A dan Val115A. Gugus fungsi senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin yang mempunyai pola interaksi yang baik adalah struktur nomer 1, 2, 7, 8, 11, 14, dan 15 dari DHFR bakteri (trimetoprim) sedangkan struktur 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14 dan 15 dari DHFR sel mamalia (metotreksat).

B. Saran


Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang adsorbsi, distribusi, metabolisme, ekskresi dengan profil farmakokinetik yang baik secara eksperimental tentang senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin terhadap DHFR bakteri dan DHFR sel mamalia.

DAFTAR PUSTAKA


- Goodman & Gilman. 2007. *Dasar Farmakologi dan Terapi*. Amalia Hanif et al, editor. EGC, Jakarta. hlm 1372.
- Goodman & Gilman. 2010. *Manual Farmakologi dan Terapi*. July Manurung et al, editor. EGC, Jakarta. hlm 685.
- Hamid Abdul A. Toha. 2010. *Ensiklopedia Biokimia & Biologi Molekuler*. EGC, editor. Buku Kedokteran EGC, Jakarta. hlm 13-14 & 448-450.
- Jain P, Soni L K, Gupta A K, Kashkedikar S G. 2005. *QSAR analysis of 2,4-diaminopyrido[2,3-d]pyrimidines dan 2,4-diaminopyrrolo[2,3-d]pyrimidines as dihidrofolat reductase inhibitors*. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. Vol. 42, october 2005. pp 315-320
- Kartasasmita RE, Herowati R, Gusdinar T. 2010. Docking Study of Quercetin Derivatives on Inducible Nitric Oxide Synthase and Prediction of their Absortion and Distribution Properties. *Journal of Applied Sciences* 10 (23): 3098-3104.
- Katzung BG. 1997. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Sjabana D et al, editor. Edisi 6. EGC. Jakarta, hlm 746-750.
- Listyani Tiara A. 2012. *Analisis Docking Molekuler Senyawa Flavonoid Polihidrosilasi/Metoksilasi terhadap Enzim Lipooksigenase dan Prediksi Parameter Absorbsi dan Distribusinya [Skripsi]*. Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Surakarta. hlm 26.
- Morris, G.M. dan Lim-Wilby, M. (2008): Molecular Docking, Methods in Molecular Biology, vol. 443, Molecular Modeling of Proteins, Kukol, A., (ed.), Humana Press, Totowa, NJ, 365-382.
- Mycek MJ. 2001. *Farmakologi*. Hartanto H, editor. Edisi ke-2. Widya Medika, Jakarta. hlm 296-297, 283
- Neal Michael J. 2005. *At a Glance Farmakologi Medis*. Amalia Safitri, editor. Edisi ke-5. Erlangga, Jakarta. hlm 80
- Schumm Dorothy E. 1993. *Intisari Biokimia*. Moch Sadikin, alih bahasa. Binarupa Aksara Jakarta
- Siswandono, Soekardjo Bambang. 1995. *Kimia Medisinal*. Universitas Airlangga, Surabaya. hlm 415
- William S. Lewist et al. 1996. *Methotrexate-resistant Variants of Human Dihydrofolate Reductase with Substitutions of Leucine 22*. The Journal of Biological Chemistry. Vol 270, No. 10, Issue of March 10, pp. 5057-5064

Lampiran 1. Hasil optimasi geometri struktur 3 dimensi dari 15 senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin menggunakan metode Mekanika Molekuler (MM+) dengan *software* HyperChem Release 7.0


1.




2.



3.



4.



= Atom C



= Atom H



= Atom Cl




= Atom N




= Atom O


5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




Lampiran 2. Pola interaksi dari 15 senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d]pirimidin pada DHFR bakteri.




*Overlay struktur nomer 1, 2, 7, 8, 11, 14, dan 15 pada gambar di atas
trimetoprim (hijau) senyawa turunan (hitam)*




*Overlay struktur nomer 3, 6, 9, dan 10 pada gambar di atas
trimetoprim (hijau) senyawa turunan (hitam)*



*Overlay struktur nomer 4 dan 12 pada gambar di atas
trimetoprim (hijau) senyawa turunan (hitam)*




*Overlay struktur nomer 5 dan 13 pada gambar di atas
trimetoprim (hijau) senyawa turunan (hitam)*




*Struktur nomer 15 pada gambar di atas
trimetoprim (hijau) senyawa turunan (hitam)*


Lampiran 3. Pola interaksi dari 15 senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d]pirimidin pada DHFR sel mamalia.




*Overlay struktur nomer 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 pada gambar di atas
metotreksat (hijau) senyawa turunan (hitam)*



Overlay struktur nomer 4, 13, dan 15 pada gambar di atas
metotreksat (hijau) senyawa turunan (hitam)




Overlay struktur nomer 3, 6, dan 12 pada gambar di atas
metotreksat (hijau) senyawa turunan (hitam)




Overlay struktur nomer 5 dan 11 pada gambar di atas
metotreksat (hijau) senyawa turunan (hitam)

Lampiran 4 Jarak ikatan hidrogen dengan senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin pada DHFR bakteri


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.



14.




15.




Lampiran 5 Jarak ikatan hidrogen dengan senyawa turunan 2,4-diaminopirido[2,3-d] pirimidin pada DHFR sel mamalia


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.



13.



14.



15.

