

INTISARI

CHOIRI, I. 2017. RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTIDEPRESAN PADA PASIEN SKIZOAFEKTIF DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN 2015-2016, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA

Skizoafektif merupakan penyakit kejiwaan kronis yang berdampak buruk bagi pasien itu sendiri. Salah satu dampak terburuk dari gangguan ini adalah bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan obat antidepresan dan rasionalitas penggunaan obat antidepresan pada pasien skizoafektif di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode 2015-2016 berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis berdasarkan *An overview of the treatment of schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat non ekperimental non (*observasional*) dengan pengumpulan data secara retrospektif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kartu rekam medik pasien rawat inap skizoafektif yang berisi tentang identitas pasien meliputi nama pasien, jenis kelamin, usia, diagnosa, dan jenis obat-obat yang digunakan pasien selama menjalani terapi. Data yang diperoleh dianalisis kerasionalannya berdasarkan *An overview of the treatment of schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data penggunaan obat antidepresan yang paling banyak digunakan untuk pasien skizoafektif adalah Fluoxetine dengan persentase sebanyak 52,3% dengan variasi obat yang paling banyak digunakan adalah risperidon sebanyak 90,9%. Kerasionalan penggunaan obat antidepresan diperoleh persentase tepat indikasi 100%, tepat obat 63,64%, tepat pasien 100%, tepat dosis 100%.

Kata kunci : Skizoafektif, Antidepresan, Rasionalitas Pengobatan

ABSTRACT

CHOIRI, I. 2017. THE RATIONALITY OF THE USE ANTIDEPRESSANT DRUG FOR SCHIZOAFFECTIVE PATIENTS IN THE INPATIENT INSTALLATION AT PSYCHIATRIC HOSPITAL OF SURAKARTA IN 2015-2016, THESIS FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY, SURAKARTA

Schizoaffective is a chronic mental disorder which have bad impacts to the patients. One of the most dangerous impact from this mental disorder is suicide. The purpose of this study is to know the description of the use of antidepressant drugs and the rationality of the use of antidepressant drugs in the schizoaffective patients at the Inpatient Installation of Surakarta Regional Mental Hospital 2015-2016 based on precise, precise, precise, appropriate dosage based on An overview of the treatment of Schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry.

This research used non experimental descriptive method (observational) with a retrospective data collection. Data used is secondary obtained from inpatient schizoaffective patient medical record card which contains about the identity of the patient, include patient name, gender, age, diagnose, and The type drugs used during therapy for patient. The data obtained were analyzed according to An overview of the treatment of schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry.

Based on the results of the research, the most widely used antidepressant drug for scizoaffective patients is Fluoxetine with 52,3% percentage With the most widely used drug variation is risperidon as much as 90.9%. The rationality of the use of antidepressant was 100% appropriate in indication, 63,64% appropriate in drug of therapy, 100% appropriate in patient, 100% appropriate in dosage.

Keywords: Schizoaffective, Antidepressant, Rationality of treatment