

ABSTRAK

NAILUFAR, Z. 2016. POLA PENGGUNAAN OBAT BIPOLAR PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG MALANG TAHUN 2015, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA.

Gangguan bipolar merupakan gangguan otak yang menyebabkan ketidakstabilan suasana hati pada depresi dan manik, dapat terjadi seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat bipolar pada pasien Rawat Jalan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang tahun 2015.

Pasien penelitian adalah pasien gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik pada pasien Rawat Jalan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang tahun 2015, pengambilan data dilakukan secara retrospektif melalui rekam medik menggunakan metode deskriptif dengan sampel 133 kasus.

Hasil penelitian menunjukkan obat dua kombinasi antipsikotik atipikal, antikonvulsan (12,4%) tiga kombinasi antipsikotik atipikal, antikonvulsan, dan antiparkinson (6,2%), empat kombinasi antipsikotik atipikal, antikonvulsan, antiparkinson, dan antipsikotik tipikal (5,3%) diikuti antipsikotik atipikal, antikonvulsan, dan antipsikotik tipikal (4,4%) dengan pengobatan tunggal paling tinggi adalah risperidon (1,8%). Kesesuaian menurut Formularium Rumah Sakit (100%), Standar Pelayanan Medik (Pedoman Praktik Klinik) sesuai (45%), tidak sesuai (55%), Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia sesuai (45%) tidak sesuai (55%), dan *Texas Medication Algorithm Project of Bipolar Disorder 2007* sesuai (60%) dan tidak sesuai (40%).

Kata kunci : Bipolar, Pasien Rawat Jalan, Metode Deskriptif

ABSTRACT

NAILUFAR, Z. 2016. PATTERNS OF DRUG USE IN BIPOLAR OUTPATIENT IN RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG MALANG 2015, FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITY OF SETIA BUDI, SURAKARTA.

Bipolar disorder is a brain disorder that causes instability in moods and manic depression, can occur a lifetime. The study aims to determine the pattern of drug use in bipolar patients in the Outpatient RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang 2015.

Patients research is bipolar affective disorder patients present hypomanic episodes in patients Outpatient in RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang 2015, data retrieval is done retrospectively through medical records using descriptive method with a sample of 133 cases.

The results showed two combinations of atypical antipsychotic drugs, anticonvulsants (12.4%) three combinations of atypical antipsychotics, anticonvulsants, and antiparkinson (6.2%), four combinations of atypical antipsychotics, anticonvulsants, antiparkinson and typical antipsychotic (5.3%) followed by atypical antipsychotic, anticonvulsant, and antipsychotic typical (4.4%) with the highest single treatment is risperidone (1.8%). Conformity according to a hospital formulary (100%), Standards of Medical Care (Code of Practice Clinic) appropriate (45%), are not appropriate (55%), the Association of Specialist Doctors Jiwa Indonesia appropriate (45%) disagree (55%), and Texas Medication Algorithm Project of Bipolar Disorder 2007 to comply (60%) and not appropriate (40%) .

Keywords: Bipolar, Outpatient, Methods Deskriptif