

INTISARI

WAHANA, DA., 2018, KAJIAN PENGGUNAAN OBAT ANTI PSIKOTIK PADA PASIEN GANGGUAN BIPOLAR DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PRIODE 2017, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI.

Gangguan afektif bipolar adalah suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa senang yang ekstrim dan depresi yang parah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat antipsikotik dan kesesuaian pengobatan pada pasien gangguan afektif bipolar di Instalasi Rawat Inap RSJD Surakarta tahun 2017.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode non eksperimental dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan mencatat catatan rekamedik pasien yang terdiagnosa gangguan afektif bipolar di RSJD Surakarta pada tahun 2017 sesuai inklusi. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 55 pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 pasien, Jenis antipsikotik yang banyak digunakan risperidon 72,72%. Depakote dan haloperidol paling sedikit digunakan yaitu 14,54%. Penggunaan antipsikotik untuk pasien gangguan bipolar di instalasi rawat inap RSJD Surakarta tahun 2017 dapat dikatakan sesuai dengan pedoman terapi dan panduan praktek klinis kesehatan jiwa. Hasil penelitian untuk tepatan dosis sebesar 96,32% dan indikasi 100%.

Kata kunci: kesesuaian penggunaan obat, gangguan afektif bipolar, antipsikotik

ABSTRACT

WAHANA, DA., 2018, DRUG USED STUDY OF ANTI PSYCHOTIC IN ANCENTIVE DISORDER IN PATIENTS INSTALLATION OF PSYCHIATRIC HOSPITALS REGIONS SURAKARTA PERIOD 2017, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY.

Bipolar affective disorder is a disorder characterized by a mood change between extreme pleasure and severe depression. This study was conducted to determine the description of the use of antipsychotic drugs and the appropriateness of treatment in affective bipolar disorder patients installed in RSJD Surakarta in 2017.

The research method used is non experimental and descriptive method. The data were collected retrospectively by recording the patient's medical records diagnosed with bipolar affective disorder at RSJD Surakarta in 2017 according to inclusion. Patients who met the inclusion criteria were 55 patients.

. The results showed that of 55 patients, Type of antipsychotics are widely used risperidon 72,72%. Depakote and haloperidolare the least used 14,54%. The use of antipsichotics for bipolar disorder patients at the RSJD Surakarta 2017 can be saide to be in accordance with therapeutic guidelines and guide clinical practice of mental health. Research results for exactly dose 96,32% and 100% indication.

Keywords: fitness suitability, bipolar affective disorder, antipsychotics