

INTISARI

WIJAYATI, I., 2019, KAJIAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI RSUD Ir. SOEKARNO SUKOHARJO TAHUN 2019, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA.

Prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia sebesar 29,1% pada tahun 2012 dengan faktor resiko hipertensi, diabetes, atau proteinuri. Kejadian hipertensi menjadi komplikasi terbesar pada gangguan ginjal yang menempati posisi 35%, sehingga perlu terapi antihipertensi. Terapi antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik diperlukan penanganan dan perhatian dalam pemilihan obat yang aman bagi pasien. Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan obat antihipertensi pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non-eksperimental dan pengambilan data secara retrospektif dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah semua data rekam medik pasien gagal ginjal kronik yang memenuhi kriteria inklusi.

Jumlah sampel 32 data rekam medik pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin terbanyak pada laki-laki 59,4%, kategori usia terbanyak pada usia >45 tahun 84,4% dan penyakit lain terbanyak hipertensi 78,1%. Pola penggunaan obat antihipertensi dalam terapi tunggal yang paling sering digunakan furosemide 56,3% dan terapi kombinasi yaitu furosemide dan diltiazem 9,4%. Kategori ketepatan didapat untuk tepat indikasi 90,6%, tepat pemilihan obat 100%, tepat dosis 65,6% dan tepat interval waktu pemberian 96,9%.

Kata kunci: antihipertensi, gagal ginjal kronik, kajian

ABSTRACT

WIJAYATI, I., 2019, STUDY OF DRUG USE ANTIHYPERTENSIVE AT PATIENTS CHRONIC KIDNEY DISEASE IN RSUD Ir. SOEKARNO SUKOHARJO YEAR 2018, Thesis, FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITY OF SETIA BUDI, Surakarta.

The prevalence of chronic kidney disease in Indonesia by 29.1% in 2012 with a risk factor for hypertension, diabetes, or proteinuria. Hypertension became the biggest complication in renal impairment who finished 35%, so it needs to antihypertensive therapy. Antihypertensive therapy in patient chronic kidney disease required handling and care in the selection of drugs that are safe for the patient. This study was aimed to determine the use of antihypertensive drugs in patient chronic kidney disease at RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo year 2018.

This study is a non-experimental descriptive and retrospective data collection by purposive sampling method. The sample used in this study were all medical records of patients with chronic kidney disease where choose with inclusion criteria.

Number of samples 32 patient medical records. The results showed that the characteristics of the patients by sex most men 59.4%, the highest age category at the age > 45 years of 84.4% and other diseases most hypertension 78.1%. Usage of antihypertensive drugs in monotherapy the most commonly used furosemide 56.3% and combination therapy ie 9.4% furosemide and diltiazem. Whereas of category right indication is 90.6%, right drug selection is 100%, right dose is 65,6% and right giving time interval is 96.9%

Keywords: hypertension, chronic kidney disease, studies