

INTISARI

SUINDAH, 2019. POLA PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI POLI OBGYN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG PERIODE BULAN JUNI – AGUSTUS 2018.

Ibu hamil yang mengalami hipertensi dengan tekanan darah diastolik $\geq$ 160 mmHg dan tekanan darah sistolik $\geq$ 100 mmHg, disebut preeklamsia yang segera ditindaklanjuti, hal ini dikhawatirkan akan terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persepan antihipertensi serta obat antihipertensi yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pengambilan data penelitian secara retrospektif terhadap resep bulan Juni – Agustus 2018. Metode pengambilan sampel menggunakan *random sampling* sebanyak 120 resep.

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik usia pasien 26 – 35 tahun (dewasa awal) sebanyak 62 pasien dengan persentase 51,66%. Usia kehamilan $\geq$ 31 minggu sampai melahirkan sebanyak 55 pasien dengan persentase 45,38%. Tekanan darah ringan sedang sebanyak 109 pasien dengan persentase 90,83%. Sedangkan obat antihipertensi yang digunakan adalah dopamet sebanyak 69 pasien dengan persentase 57,50%.

Kata kunci: antihipertensi, kehamilan, preeklamsia

ABSTRACT

SUINDAH, 2019. ANTI-HYPERTENSION DRUG PREPARATION PATTERNS IN PREGNANT MOMS IN OBGYN PATIENTS OF PATIENTS OF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG PERIOD MONTH JUNE – AUGUST 2018.

Pregnant women who experience hypertension with diastolic blood pressure ≥ 160 mmHg and systolic blood pressure ≥ 100 mmHg, called preeclampsia which are immediately followed up, it is feared that bleeding will result in death of both mother and fetus. This study aims to determine the antihypertensive prescribing patterns and antihypertensive drugs used.

The research method used was descriptive analysis and retrospective research data retrieval of recipes from June to August 2018. The sampling method used was 120 random sampling.

The results showed the age characteristics of patients 26-35 years (early adulthood) were 62 patients with a percentage of 51.66%. Gestational age ≥ 31 weeks until delivery as many as 55 patients with a percentage of 45.38%. Moderate mild blood pressure of 109 patients with a percentage of 90.83%. While the antihypertensive drug used is dopamet as many as 69 patients with a percentage of 57.50%.

Keywords: antihypertention, pregnancy, preeklamsia